

# 大腸内視鏡検査を受けられる方へ

湘南茅ヶ崎クリニック

## 【検査・処置の流れ】

		検査前日 / ( 曜日 )	検査当日 / ( 曜日 )
<p>ムーベン服用  <input type="checkbox"/>自宅服用 <input type="checkbox"/>クリニックで服用</p> <p>あなたの検査日・時間は時間は  <b>月 日 ( 曜日 )</b>  <b>時 分</b> です。                      来院・受付は、検査開始30分前の  <b>時 分</b> です。                      この用紙は受付に提出してください。</p>		<p><b>食 事</b></p> <p>※ <b>夕食は消化の良いものを20時までに</b>摂るようにしてください。それ以降は水分のみで、<b>のどが渴いたら積極的に水分補給</b>してください。</p> <p>※ アメ・ガムは摂取可能です。</p> <p>&lt;消化の悪いもの&gt;                      海藻類、こんにゃく、きのこ類、ごま、種のある野菜・果物は避けてください。</p>	<p>※ 朝食は絶対に摂らないでください。</p> <p>※ 水分は<b>来院前30分までは摂取は自由</b>です。のどが渴いたら積極的に水分(水、お茶、紅茶、ポカリスエットなど)を補給してください。</p> <p>※ 空腹が強いときはアメ・ガムは摂取しても大丈夫です。</p>
<p><b>【 検査前のチェック項目 】</b></p> <p>① 麻酔薬に対するアレルギー  <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>② 血が固まりにくくなる薬を飲んでいますか？  <input type="checkbox"/>飲んでいる <input type="checkbox"/>飲んでいない</p>		<p><b>薬</b></p> <p>※ 普段から薬を服用されている方は(医師から特別な指示が無ければ)、いつも通りに服用してください。</p> <p>※ 21時に下剤(ラクソベロン)を200ccの水に溶かして服用してください。</p> <p>《 注意! 》                      医師から薬の中止の指示がある方は、                      【薬名: _____】を                      [ 月 日 ]                      から中止してください。</p>	<p>※ 朝の常用薬のある方は(医師から特別な指示が無ければ)、<b>朝7時</b>に服用してください。昼の常用薬のある方は持参してください。</p> <p>※ 8時45分頃より腸洗浄液(ムーベン)を飲み始めます(自宅・クリニックともに)。</p> <p>《 注意! 》                      ※ 糖尿病の方は、内服の糖尿病薬、インスリン注射を中止してください。</p> <p>※ 低血糖発作時は、スプーン大さじ2杯の砂糖とコップ1杯の水を飲んでください。</p>
		<p><b>便</b></p> <p>下剤(ラクソベロン)を飲むことにより、翌日の朝に便が出ます。これには個人差があり、多量に出る人、あまり出ない人、初めから下痢になる人と様々です。</p>	<p>腸洗浄液(ムーベン)は、初めの1000mlを1時間かけて(200mlずつ)飲みます。便が出始めたら残りの1000mlをもう1時間かけて内服し、5~7回で水様下痢がきれいになったら検査開始可能となります。</p>

◎ 検査当日は・・・ 服装はなるべくゆったりしたものでおこしください。検査当日は鎮静剤などを使用する場合があるので、車・バイクを運転しての来院はおやめください。

◎ ご不明な点がございましたら、電話でお問い合わせください。 湘南茅ヶ崎クリニック TEL0467-38-6603  
 (木曜を除く平日:午前8時30分~12時、午後1時~5時、土曜:午前8時30分~12時、日・祝日休み)